

Connaître

- 1 a) F b) F c) V d) F e) V f) V g) V h) F i) V j) F k) F

- 2 a) Exemple : $A(x) = 2 + 2x + 2x^2 + 2x^3$
 $A(x)$, polynôme réduit de degré 3, doit posséder 4 termes pour être complet.
- b) Exemple : $B(x) = 2x^4 + 2x^2 + 2x + 2$
 $B(x)$, polynôme réduit de degré 4, doit posséder au maximum 4 termes pour être incomplet.

- 3 a) H(x) b) B(x) c) G(x) d) J(x) e) I(x) f) A(x)

4

Degré			
A(x)	B(x)	$A(x) + B(x)$	$A(x) \cdot B(x)$
4	2	= 4	= 6
1	3	= 3	= 4
4	4	≤ 4	= 8
a	a	≤ a	= 2a

Degré			
A(x)	B(x)	$A(x) + B(x)$	$A(x) \cdot B(x)$
a	$a + 1$	= a + 1	= 2a + 1
a	$a - 2$	= a	= 2a - 2
$a - 2$	$a - 1$	= a - 1	= 2a - 3
a	$2a$	= 2a	= 3a

- 5 a) $(a - b)^2 \neq (a + b)^2$
 $(a - b)^2 = (b - a)^2$
 $(a - b)^2 = (-a + b)^2$
 $(a - b)^2 \neq (-a - b)^2$
 $(a + b)^2 = (-a - b)^2$
- b) $(a + b) \cdot (a - b) \neq (a - b) \cdot (a - b)$
 $(a + b) \cdot (a - b) = (b + a) \cdot (a - b)$
 $(a + b) \cdot (a - b) \neq (b + a) \cdot (b - a)$
 $(a + b) \cdot (a - b) \neq (-a + b) \cdot (a + b)$
 $(a + b) \cdot (a - b) = (-a + b) \cdot (-a - b)$
- 6 a) terme du degré le plus élevé du quotient : $2x^2$
d° $Q(x) = 2$
d° $R(x) < 2$
- b) terme du degré le plus élevé du quotient : -3
d° $Q(x) = 0$
d° $R(x) < 3$
- c) terme du degré le plus élevé du quotient : $-2x$
d° $Q(x) = 1$
d° $R(x) < 4$
- d) terme du degré le plus élevé du quotient : $-\frac{3}{2}x^3$
d° $Q(x) = 3$
d° $R(x) < 2$
- e) terme du degré le plus élevé du quotient : x
d° $Q(x) = 1$
d° $R(x) < 1 \Rightarrow d° R(x) = 0$
- f) terme du degré le plus élevé du quotient : $3x^3$
d° $Q(x) = 3$
d° $R(x) < 1 \Rightarrow d° R(x) = 0$

Appliquer

1 $P = 4 \cdot (x + 4) = 4x + 16$ $A = (x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

2 a) $P = (x + 4 + x) \cdot 2 = (2x + 4) \cdot 2 = 4x + 8$

$$A = (x + 4) \cdot x = x^2 + 4x$$

b) $P = (2x + 1 + x + 1) \cdot 2 = (3x + 2) \cdot 2 = 6x + 4$

$$A = (2x + 1) \cdot (x + 1) = 2x^2 + 2x + x + 1 = 2x^2 + 3x + 1$$

3 a) $P = 2 \cdot (5x + 2) + 2 \cdot (4x - 1)$

$$= 10x + 4 + 8x - 2$$

$$= 18x + 2$$

$$A = (4x - 1) \cdot (5x + 2) - (8x - 3) \cdot ((4x - 1) - x)$$

$$= (4x - 1) \cdot (5x + 2) - (8x - 3) \cdot (4x - 1 - x)$$

$$= (4x - 1) \cdot (5x + 2) - (8x - 3) \cdot (3x - 1)$$

$$= 20x^2 + 8x - 5x - 2 - (24x^2 - 8x - 9x + 3)$$

$$= 20x^2 + 8x - 5x - 2 - 24x^2 + 8x + 9x - 3$$

$$= -4x^2 + 20x - 5$$

b) $P = 2 \cdot \pi \cdot (2x - 1) = 4\pi x - 2\pi$

$$A = \pi \cdot (2x - 1)^2 = \pi \cdot (4x^2 - 4x + 1) = 4\pi x^2 - 4\pi x + \pi$$

c) $P = 2 \cdot (3x + 2) + (4x + 2) = 6x + 4 + 4x + 2 = 10x + 6$

$$A = \frac{(4x + 2) \cdot (5x - 1)}{2} = \frac{20x^2 - 4x + 10x - 2}{2} = \frac{20x^2 + 6x - 2}{2} = 10x^2 + 3x - 1$$

4 Aire totale des faces : $2 \cdot 2x \cdot (2x - 1) + 2 \cdot 2x \cdot (2x + 1) + 2 \cdot (2x + 1) \cdot (2x - 1)$

$$= 4x \cdot (2x - 1) + 4x \cdot (2x + 1) + 2 \cdot (4x^2 - 1)$$

$$= 8x^2 - 4x + 8x^2 + 4x + 8x^2 - 2$$

$$= 24x^2 - 2$$

Volume : $2x \cdot (2x + 1) \cdot (2x - 1) = 2x \cdot (4x^2 - 1) = 8x^3 - 2x$

5 $A(2) = -3 \cdot 2^2 + 2 - 4 = -3 \cdot 4 + 2 - 4 = -12 + 2 - 4 = -14$

$$A(3) = -3 \cdot 3^2 + 3 - 4 = -3 \cdot 9 + 3 - 4 = -27 + 3 - 4 = -28$$

$$A(-2) = -3 \cdot (-2)^2 + (-2) - 4 = -3 \cdot 4 - 2 - 4 = -12 - 2 - 4 = -18$$

$$A(1) = -3 \cdot 1^2 + 1 - 4 = -3 \cdot 1 + 1 - 4 = -3 + 1 - 4 = -6$$

$$A(-3) = -3 \cdot (-3)^2 + (-3) - 4 = -3 \cdot 9 - 3 - 4 = -27 - 3 - 4 = -34$$

$$A(-1) = -3 \cdot (-1)^2 + (-1) - 4 = -3 \cdot 1 - 1 - 4 = -3 - 1 - 4 = -8$$

$$A(0) = -3 \cdot 0^2 + 0 - 4 = -3 \cdot 0 + 0 - 4 = 0 + 0 - 4 = -4$$

$$A\left(\frac{1}{2}\right) = -3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} - 4 = -3 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 4 = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - 4 = \frac{-3+2-16}{4} = \frac{-17}{4}$$

$$A\left(\frac{2}{3}\right) = -3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} - 4 = -3 \cdot \frac{4}{9} + \frac{2}{3} - 4 = -\frac{4}{3} + \frac{2}{3} - 4 = \frac{-4+2-12}{3} = \frac{-14}{3}$$

$$A\left(\frac{-1}{10}\right) = -3 \cdot \left(\frac{-1}{10}\right)^2 + \frac{-1}{10} - 4 = -3 \cdot \frac{1}{100} + \frac{-1}{10} - 4 = -\frac{3}{100} + \frac{-1}{10} - 4 = \frac{-3-10-400}{100} = \frac{-413}{100}$$

$$B(2) = 2 \cdot 2^3 - 2 + 1 = 2 \cdot 8 - 2 + 1 = 16 - 2 + 1 = 15$$

$$B(3) = 2 \cdot 3^3 - 3 + 1 = 2 \cdot 27 - 3 + 1 = 54 - 3 + 1 = 52$$

$$B(-2) = 2 \cdot (-2)^3 - (-2) + 1 = 2 \cdot (-8) + 2 + 1 = -16 + 2 + 1 = -13$$

$$B(1) = 2 \cdot 1^3 - 1 + 1 = 2 \cdot 1 - 1 + 1 = 2 - 1 + 1 = 2$$

$$B(-3) = 2 \cdot (-3)^3 - (-3) + 1 = 2 \cdot (-27) + 3 + 1 = -54 + 3 + 1 = -50$$

$$B(-1) = 2 \cdot (-1)^3 - (-1) + 1 = 2 \cdot (-1) + 1 + 1 = -2 + 1 + 1 = 0$$

$$B(0) = 2 \cdot 0^3 - 0 + 1 = 2 \cdot 0 - 0 + 1 = 0 - 0 + 1 = 1$$

$$B\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \frac{1}{2} + 1 = 2 \cdot \frac{1}{8} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{1-2+4}{4} = \frac{3}{4}$$

$$B\left(\frac{2}{3}\right) = 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 - \frac{2}{3} + 1 = 2 \cdot \frac{8}{27} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{16}{27} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{16-18+27}{27} = \frac{25}{27}$$

$$B\left(\frac{-1}{10}\right) = 2 \cdot \left(\frac{-1}{10}\right)^3 - \frac{-1}{10} + 1 = 2 \cdot \frac{-1}{1000} + \frac{1}{10} + 1 = \frac{-1}{500} + \frac{1}{10} + 1 = \frac{-1+50+500}{500} = \frac{549}{500}$$

$$C(2) = 2^3 + 5 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 + 2 = 8 + 5 \cdot 4 - 4 \cdot 2 + 2 = 8 + 20 - 8 + 2 = 22$$

$$C(3) = 3^3 + 5 \cdot 3^2 - 4 \cdot 3 + 2 = 27 + 5 \cdot 9 - 4 \cdot 3 + 2 = 27 + 45 - 12 + 2 = 62$$

$$C(-2) = (-2)^3 + 5 \cdot (-2)^2 - 4 \cdot (-2) + 2 = -8 + 5 \cdot 4 - 4 \cdot (-2) + 2 = -8 + 20 + 8 + 2 = 22$$

$$C(1) = 1^3 + 5 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 + 2 = 1 + 5 \cdot 1 - 4 \cdot 1 + 2 = 1 + 5 - 4 + 2 = 4$$

$$C(-3) = (-3)^3 + 5 \cdot (-3)^2 - 4 \cdot (-3) + 2 = -27 + 5 \cdot 9 - 4 \cdot (-3) + 2 = -27 + 45 + 12 + 2 = 32$$

$$C(-1) = (-1)^3 + 5 \cdot (-1)^2 - 4 \cdot (-1) + 2 = -1 + 5 \cdot 1 - 4 \cdot (-1) + 2 = -1 + 5 + 4 + 2 = 10$$

$$C(0) = 0^3 + 5 \cdot 0^2 - 4 \cdot 0 + 2 = 0 + 5 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 2 = 0 + 0 - 0 + 2 = 2$$

$$\begin{aligned} C\left(\frac{1}{2}\right) &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{1}{8} + 5 \cdot \frac{1}{4} - 4 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{1}{8} + \frac{5}{4} - \cancel{2} + \cancel{2} \\ &= \frac{1+10}{8} = \frac{11}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C\left(\frac{2}{3}\right) &= \left(\frac{2}{3}\right)^3 + 5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 4 \cdot \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{27} + 5 \cdot \frac{4}{9} - 4 \cdot \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{27} + \frac{20}{9} - \frac{8}{3} + 2 \\ &= \frac{8+60-72+54}{27} = \frac{50}{27} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C\left(\frac{-1}{10}\right) &= \left(\frac{-1}{10}\right)^3 + 5 \cdot \left(\frac{-1}{10}\right)^2 - 4 \cdot \frac{-1}{10} + 2 = \frac{-1}{1000} + 5 \cdot \frac{1}{100} + 4 \cdot \frac{1}{10} + 2 \\ &= \frac{-1}{1000} + \frac{1}{20} + \frac{2}{5} + 2 \\ &= \frac{-1+50+400+2000}{1000} = \frac{2449}{1000} \end{aligned}$$

$$D(2) = -2^3 + 4 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 - 1 = -8 + 4 \cdot 4 - 2 \cdot 2 - 1 = -8 + 16 - 4 - 1 = 3$$

$$D(3) = -3^3 + 4 \cdot 3^2 - 2 \cdot 3 - 1 = -27 + 4 \cdot 9 - 2 \cdot 3 - 1 = -27 + 36 - 6 - 1 = 2$$

$$D(-2) = -(-2)^3 + 4 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) - 1 = -(-8) + 4 \cdot 4 - 2 \cdot (-2) - 1 = 8 + 16 + 4 - 1 = 27$$

$$D(1) = -1^3 + 4 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 - 1 = -1 + 4 \cdot 1 - 2 \cdot 1 - 1 = -1 + 4 - 2 - 1 = 0$$

$$D(-3) = -(-3)^3 + 4 \cdot (-3)^2 - 2 \cdot (-3) - 1 = -(-27) + 4 \cdot 9 - 2 \cdot (-3) - 1 = 27 + 36 + 6 - 1 = 68$$

$$D(-1) = -(-1)^3 + 4 \cdot (-1)^2 - 2 \cdot (-1) - 1 = -(-1) + 4 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) - 1 = 1 + 4 + 2 - 1 = 6$$

$$D(0) = -0^3 + 4 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 - 1 = 0 + 4 \cdot 0 - 2 \cdot 0 - 1 = 0 + 0 - 0 - 1 = -1$$

$$\begin{aligned} D\left(\frac{1}{2}\right) &= -\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{8} + 4 \cdot \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{8} + \cancel{1} - \cancel{1} - 1 \\ &= \frac{-1-8}{8} = \frac{-9}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D\left(\frac{2}{3}\right) &= -\left(\frac{2}{3}\right)^3 + 4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{2}{3} - 1 = -\frac{8}{27} + 4 \cdot \frac{4}{9} - 2 \cdot \frac{2}{3} - 1 = -\frac{8}{27} + \frac{16}{9} - \frac{4}{3} - 1 \\ &= \frac{-8+48-36-27}{27} = \frac{-23}{27} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D\left(\frac{-1}{10}\right) &= -\left(\frac{-1}{10}\right)^3 + 4 \cdot \left(\frac{-1}{10}\right)^2 - 2 \cdot \frac{-1}{10} - 1 = -\frac{-1}{1000} + 4 \cdot \frac{1}{100} - 2 \cdot \frac{-1}{10} - 1 \\ &= \frac{1}{1000} + \frac{1}{25} + \frac{1}{5} - 1 \\ &= \frac{1+40+200-1000}{1000} = \frac{-759}{1000} \end{aligned}$$

6

a) $A(0) = 0$

$$3 \cdot 0^2 + 2 \cdot 0 + a = 0$$

$$3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + a = 0$$

$$0 + 0 + a = 0$$

$$a = 0$$

b) $B(-1) = -5$

$$2 \cdot (-1)^2 - a \cdot (-1) + 3 = -5$$

$$2 \cdot 1 - a \cdot (-1) + 3 = -5$$

$$2 + a + 3 = -5$$

$$a + 5 = -5$$

$$a = -5 - 5$$

$$a = -10$$

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

c) $C(2) = 1$
 $a \cdot 2^2 + 5 \cdot 2 + 3 = 1$
 $a \cdot 4 + 5 \cdot 2 + 3 = 1$
 $4a + 10 + 3 = 1$
 $4a + 13 = 1$
 $4a = 1 - 13$
 $4a = -12$
 $a = -3$

d) $D(-2) = -1$
 $2 \cdot (-2)^3 + a \cdot (-2) + 1 = -1$
 $2 \cdot (-8) + a \cdot (-2) + 1 = -1$
 $-16 - 2a + 1 = -1$
 $-2a - 15 = -1$
 $-2a = -1 + 15$
 $-2a = 14$
 $a = -7$

7 A(x) = $x^3 - 12x^2 - 3x - 9$
A(x) est un polynôme de degré 3 et complet.

B(x) = $-4x + 6$
B(x) est un polynôme de degré 1 et complet.

C(x) = $2x^4 - x^3 + 2x + 1$
C(x) est un polynôme de degré 4 et incomplet (il manque le terme de degré 2).

D(x) = $-3x^5 - 5x^4 + x^3 - 2x^2 - 6x - 1$
D(x) est un polynôme de degré 5 et complet.

E(x) = $-2x^4 + 6x^2 - x$
E(x) est un polynôme de degré 4 et incomplet (il manque les termes de degré 3 et de degré 0).

F(x) = $-x^3 - 4x^2 + 6x + 1$
F(x) est un polynôme de degré 3 et complet.

8 A(x) = $-x^3 - x$ E(x) = $x^2 - \sqrt{5}x + 3\sqrt{5}$
B(x) = $-2ax^2 + 2x + 2$ F(x) = $-4x^3 + x^2$
C(x) = $(a + b)x^3 + x^2 + (a - b)x - 4$ G(x) = $-\sqrt{3}x^3 + x^2 + 2x - 1$
D(x) = $(1 - a)x^3 + (b - a)x^2 + (-2a + b)x$ H(x) = $2x^2 + (\sqrt{3} - \sqrt{5})x - 4$

9	a)	Étape 1 $3 = a - 3$ $6 = a$	Étape 2 $-7 = c$	Étape 3 $2b - 1 = b$ $b = 1$
b)	Étape 1 $-5 = 2a + 1$ $-5 - 1 = 2a$ $-6 = 2a$ $-3 = a$	Étape 2 $-4 = a + b$ $-4 = -3 + b$ $-4 + 3 = b$ $-1 = b$	Étape 3 $c - 2b = 3$ $c - 2 \cdot (-1) = 3$ $c + 2 = 3$ $c = 3 - 2$ $c = 1$	
c)	Étape 1 $a + b = a - b$ $a + b - a + b = 0$ $2b = 0$ $b = 0$	Étape 2 $0 = a - 2$ $2 = a$	Étape 3 $c - 3a = -9$ $c - 3 \cdot 2 = -9$ $c - 6 = -9$ $c = -3$	

10 a) $A(x) = x^3 + 2x - 1$
 $B(x) = x^2 - 2x + 3$
 \hline
 $A(x) + B(x) = x^3 + x^2 (+ 0x) + 2$
 \hline
 $A(x) = x^3 + 2x - 1$
 $-B(x) = -x^2 + 2x - 3$
 \hline
 $A(x) - B(x) = x^3 - x^2 + 4x - 4$

$B(x) - A(x) = -(-B(x) + A(x)) = -(A(x) - B(x)) = -(x^3 - x^2 + 4x - 4) = -x^3 + x^2 - 4x + 4$

b)

A(x) =	x^3	+ 2x	- 1	
B(x) =	x^2	- 2x	+ 3	
C(x) =	$-3x^2$	+ x	- 2	
A(x) + B(x) + C(x) =	x^3	$-2x^2$	+ x	(+ 0)

A(x) =	x^3	+ 2x	- 1	
-B(x) =	$-x^2$	+ 2x	- 3	
C(x) =	$-3x^2$	+ x	- 2	
A(x) - B(x) + C(x) =	x^3	$-4x^2$	+ 5x	- 6

$$-A(x) + B(x) - C(x) = -(A(x) - B(x) + C(x)) = -(x^3 - 4x^2 + 5x - 6) = -x^3 + 4x^2 - 5x + 6$$

c)

D(x) =	x^2	+ $\frac{1}{2}x$	- 3	
E(x) =	$-\frac{2}{3}x^3$	$-\frac{x^2}{4}$	+ 4x	- 1
D(x) + E(x) =	$-\frac{2}{3}x^3$	$+\frac{3}{4}x^2$	$+\frac{9}{2}x$	- 4

E(x) =	$-\frac{2}{3}x^3$	$-\frac{x^2}{4}$	+ 4x	- 1	
-F(x) =	$-x^4$	$-\frac{1}{4}x^3$	$-\frac{5}{2}x^2$	+ 1	
E(x) - F(x) =	$-x^4$	$-\frac{11}{12}x^3$	$-\frac{11}{4}x^2$	+ 4x	(+ 0)

$$D(x) - E(x) + F(x) = D(x) - (E(x) - F(x))$$

D(x) =	x^2	+ $\frac{1}{2}x$	- 3		
-(E(x) - F(x)) =	x^4	$+\frac{11}{12}x^3$	$+\frac{11}{4}x^2$	- 4x	
D(x) - E(x) + F(x) =	x^4	$+\frac{11}{12}x^3$	$+\frac{15}{4}x^2$	$-\frac{7}{2}x$	- 3

- 11 a) $(x - 1) \cdot (x + 5) = x^2 + 5x - x - 5 = x^2 + 4x - 5$
 $(x - 3) \cdot (x - 1) = x^2 - x - 3x + 3 = x^2 - 4x + 3$
 $(3x + 1) \cdot (x - 5) = 3x^2 - 15x + x - 5 = 3x^2 - 14x - 5$
- b) $(-x^4 + 1) \cdot (2 - x^2) = -2x^4 + x^6 + 2 - x^2 = x^6 - 2x^4 - x^2 + 2$
 $(3x^3 + 1) \cdot (x^3 - 3) = 3x^6 - 9x^3 + x^3 - 3 = 3x^6 - 8x^3 - 3$
 $(-7x^2 + 3) \cdot (x^2 - 1) = -7x^4 + 7x^2 + 3x^2 - 3 = -7x^4 + 10x^2 - 3$
- c) $(-2x^3 - 1) \cdot (1 - x^4) = -2x^3 + 2x^7 - 1 + x^4 = 2x^7 + x^4 - 2x^3 - 1$
 $(x^2 + 2) \cdot (x - 3) = x^3 - 3x^2 + 2x - 6$
 $(3x^4 + 1) \cdot (2 - x^4) = 6x^4 - 3x^8 + 2 - x^4 = -3x^8 + 5x^4 + 2$
- d) $(\sqrt{3}x - 2) \cdot (\sqrt{3}x + 1) = 3x^2 + \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}x - 2 = 3x^2 - \sqrt{3}x - 2$
 $(2\sqrt{2}x + 3) \cdot (\sqrt{2}x - 2) = 4x^2 - 4\sqrt{2}x + 3\sqrt{2}x - 6 = 4x^2 - \sqrt{2}x - 6$
 $(\sqrt{5}x - 3\sqrt{2}y) \cdot (-\sqrt{5}x - 2\sqrt{2}y) = -5x^2 - 2\sqrt{10}xy + 3\sqrt{10}xy + 12y^2 = -5x^2 + \sqrt{10}xy + 12y^2$
- e) $(x - y) \cdot (x + 2y) = x^2 + 2xy - xy - 2y^2 = x^2 + xy - 2y^2$
 $(5x + y) \cdot (x - 3y) = 5x^2 - 15xy + xy - 3y^2 = 5x^2 - 14xy - 3y^2$
 $(-2x + y) \cdot (-x + 3y) = 2x^2 - 6xy - xy + 3y^2 = 2x^2 - 7xy + 3y^2$

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

f) $(x^3 - y) \cdot (2x^3 + 3y) = 2x^6 + 3x^3y - 2x^3y - 3y^2 = 2x^6 + x^3y - 3y^2$
 $(-x^5 + y^3) \cdot (y^3 - 2x^5) = -x^5y^3 + 2x^{10} + y^6 - 2x^5y^3 = 2x^{10} - 3x^5y^3 + y^6$
 $(x^3 + 2y^2) \cdot (x^3 - y^2) = x^6 - x^3y^2 + 2x^3y^2 - 2y^4 = x^6 + x^3y^2 - 2y^4$

12 a)

	$B(x) =$	$-2x^3$	$+x^2$	$-x$	$+3$		
	$A(x) =$	$3x^2$			-1		
		$+2x^3$	$-x^2$	$+x$	-3		
	$-6x^5$	$+3x^4$	$-3x^3$	$+9x^2$			
	$B(x) \cdot A(x) =$	$-6x^5$	$+3x^4$	$-x^3$	$+8x^2$	$+x$	-3

$$2B(x) \cdot 3A(x) = 6 \cdot (B(x) \cdot A(x)) = 6 \cdot (-6x^5 + 3x^4 - x^3 + 8x^2 + x - 3) \\ = -36x^5 + 18x^4 - 6x^3 + 48x^2 + 6x - 18$$

$$5B(x) \cdot 2A(x) = 10 \cdot (B(x) \cdot A(x)) = 10 \cdot (-6x^5 + 3x^4 - x^3 + 8x^2 + x - 3) \\ = -60x^5 + 30x^4 - 10x^3 + 80x^2 + 10x - 30$$

b)

	$B(x) =$	$-2x^3$	$+x^2$	$-x$	$+3$			
	$C(x) =$	$-x^3$	$+3x^2$		-2			
		$+4x^3$	$-2x^2$	$+2x$	-6			
	$-6x^5$	$+3x^4$	$-3x^3$	$+9x^2$				
	$+2x^6$	$-x^5$	$+x^4$	$-3x^3$				
	$B(x) \cdot C(x) =$	$+2x^6$	$-7x^5$	$+4x^4$	$-2x^3$	$+7x^2$	$+2x$	-6

$$-B(x) \cdot (-C(x)) = B(x) \cdot C(x) = 2x^6 - 7x^5 + 4x^4 - 2x^3 + 7x^2 + 2x - 6$$

$$-B(x) \cdot C(x) = -(B(x) \cdot C(x)) = -(2x^6 - 7x^5 + 4x^4 - 2x^3 + 7x^2 + 2x - 6) \\ = -2x^6 + 7x^5 - 4x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 2x + 6$$

c)

	$E(x) =$	$-\frac{1}{2}x^3$	$+x^2$	$-2x$	-1			
	$F(x) =$	x^3		$-\frac{2}{3}x$	-1			
		$+\frac{1}{2}x^3$	$-x^2$	$+2x$	$+1$			
		$+\frac{1}{3}x^4$	$-\frac{2}{3}x^3$	$+\frac{4}{3}x^2$	$+\frac{2}{3}x$			
	$-\frac{1}{2}x^6$	$+x^5$	$-2x^4$	$-1x^3$				
	$E(x) \cdot F(x) =$	$-\frac{1}{2}x^6$	$+x^5$	$-\frac{5}{3}x^4$	$-\frac{7}{6}x^3$	$+\frac{1}{3}x^2$	$+\frac{8}{3}x$	$+1$

$$E(x) \cdot 2F(x) = 2 \cdot (E(x) \cdot F(x)) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}x^6 + x^5 - \frac{5}{3}x^4 - \frac{7}{6}x^3 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{8}{3}x + 1 \right) \\ = -x^6 + 2x^5 - \frac{10}{3}x^4 - \frac{7}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^2 + \frac{16}{3}x + 2$$

$$-2 \cdot E(x) \cdot F(x) = -2 \cdot (E(x) \cdot F(x)) = -2 \cdot \left(-\frac{1}{2}x^6 + x^5 - \frac{5}{3}x^4 - \frac{7}{6}x^3 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{8}{3}x + 1 \right) \\ = x^6 - 2x^5 + \frac{10}{3}x^4 + \frac{7}{3}x^3 - \frac{2}{3}x^2 - \frac{16}{3}x - 2$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{d)} & \begin{array}{l} D(x) = \\ C(x) = \end{array} & \begin{array}{cccccc} x^3 & -3x^2 & -2x & +1 \\ -x^3 & +3x^2 & & & \\ -2x^3 & +6x^2 & +4x & -2 \\ \hline \end{array} \\
 & & \begin{array}{cccccc} +3x^5 & -9x^4 & -6x^3 & +3x^2 \\ -x^6 & +3x^5 & +2x^4 & -x^3 \\ -x^6 & +6x^5 & -7x^4 & -9x^3 & +9x^2 & +4x & -2 \end{array} \\
 & D(x) \cdot C(x) = & \begin{array}{cccccc} -x^6 & +6x^5 & -7x^4 & -9x^3 & +9x^2 & +4x & -2 \end{array} \\
 & D(x) \cdot C(x) = & \begin{array}{cccccc} -x^6 & +6x^5 & -7x^4 & -9x^3 & +9x^2 & +4x & -2 \end{array} \\
 & A(x) = & \begin{array}{cccccc} 3x^2 & & & & & \\ \hline & +x^6 & -6x^5 & +7x^4 & +9x^3 & -9x^2 & -4x & +2 \\ & -3x^8 & +18x^7 & -21x^6 & -27x^5 & +27x^4 & +12x^3 & -6x^2 \end{array} \\
 & C(x) \cdot D(x) \cdot A(x) = & \begin{array}{cccccc} -3x^8 & +18x^7 & -20x^6 & -33x^5 & +34x^4 & +21x^3 & -15x^2 & -4x & +2 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 -10D(x) \cdot (-C(x)) \cdot (-A(x)) &= -10 \cdot (D(x) \cdot C(x) \cdot A(x)) \\
 &= -10 \cdot (-3x^8 + 18x^7 - 20x^6 - 33x^5 + 34x^4 + 21x^3 - 15x^2 - 4x + 2) \\
 &= 30x^8 - 180x^7 + 200x^6 + 330x^5 - 340x^4 - 210x^3 + 150x^2 + 40x - 20
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D(x) \cdot (-5C(x)) \cdot (-2A(x)) &= 10 \cdot (D(x) \cdot C(x) \cdot A(x)) \\
 &= 10 \cdot (-3x^8 + 18x^7 - 20x^6 - 33x^5 + 34x^4 + 21x^3 - 15x^2 - 4x + 2) \\
 &= -30x^8 + 180x^7 - 200x^6 - 330x^5 + 340x^4 + 210x^3 - 150x^2 - 40x + 20
 \end{aligned}$$

- 13**
- | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|
| a) $x^2 - 9$ | b) $x^2 + 8x + 16$ | c) $x^6 - 4$ | d) $x^6 + 8x^3 + 16$ |
| $9x^2 - 1$ | $49 + 28x + 4x^2$ | $9a^8 - 4$ | $25a^2 - 10a^3 + a^4$ |
| $25 - 4a^2$ | $25a^2 - 30a + 9$ | $25 - 9x^4$ | $4x^6 - 12x^4 + 9x^2$ |
| $49 - 4x^2$ | $9a^2 - 30a + 25$ | $1 - 4x^6$ | $9a^6 + 12a^5 + 4a^4$ |
| e) $5 - 9x^2$ | f) $9x^2 + 6\sqrt{2}x + 2$ | g) $9 - x^2y^2$ | |
| $x^2 - 12$ | $75 - 10\sqrt{3} + x^2$ | $x^2 - 9y^2$ | |
| $x^4 - 2$ | $96 + 8\sqrt{12}x^2 + 2x^4 = 96 + 16\sqrt{3}x^2 + 2x^4$ | $x^4 - 16y^2$ | |
| $36x^4 - 54$ | $16x^4 - 16\sqrt{3}x^2 + 12$ | $x^2y^4 - 9$ | |
| h) $4x^2 + 12xy + 9y^2$ | i) $1 - \frac{9}{4}x^6$ | g) $\frac{x^2}{9} - \frac{9y^2}{4}$ | |
| $x^2 - 4xy + 4y^2$ | $16x^4 - \frac{1}{9}y^2$ | $\frac{x^6}{4} - \frac{9y^4}{25}$ | |
| $49x^4 - 14x^2y + y^2$ | $\frac{4}{9}x^4 - 4x^2 + 9$ | $\frac{x^2y^2}{36} + \frac{xy}{9} + \frac{1}{9}$ | |
| $25x^4y^2 + 30x^3y^4 + 9x^2y^6$ | $\frac{x^8}{16} + \frac{1}{3}x^4 + \frac{4}{9}$ | $\frac{9}{4}x^2 - 3xy^2 + y^4$ | |

14

$$\begin{aligned}
 P(a+1) - P(a-1) &= 0 \\
 (3 \cdot (a+1)^2 - 2 \cdot (a+1) + 4) - (3 \cdot (a-1)^2 - 2 \cdot (a-1) + 4) &= 0 \\
 (3 \cdot (a^2 + 2a + 1) - 2 \cdot (a+1) + 4) - (3 \cdot (a^2 - 2a + 1) - 2 \cdot (a-1) + 4) &= 0 \\
 (3a^2 + 6a + 3 - 2a - 2 + 4) - (3a^2 - 6a + 3 - 2a + 2 + 4) &= 0 \\
 (3a^2 + 4a + 5) - (3a^2 - 8a + 9) &= 0 \\
 3a^2 + 4a + 5 - 3a^2 + 8a - 9 &= 0 \\
 12a - 4 &= 0 \\
 12a &= 4
 \end{aligned}$$

$$a = \frac{4}{12}$$

$$a = \frac{1}{3}$$

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

- 15**
- $9x^2 + 12x + 4 - (4x^2 - 1) = 9x^2 + 12x + 4 - 4x^2 + 1 = 5x^2 + 12x + 5$
 $-15x + 9x^2 - 3x^2 + 2x = 6x^2 - 13x$
 $6x^2 + 10x + x^2 - 10x + 25 = 7x^2 + 25$
 $9x^2 - 4 - (4x^2 - 12x + 9) = 9x^2 - 4 - 4x^2 + 12x - 9 = 5x^2 + 12x - 13$
 $25x^2 - 9 - 15x - 3x^2 = 22x^2 - 15x - 9$
 - $3x \cdot (x^2 - 6x + 9) + x^2 - 9 = 3x^3 - 18x^2 + 27x + x^2 - 9 = 3x^3 - 17x^2 + 27x - 9$
 $(4x^2 - 3)^2 - (4x - 3)^2 = 16x^4 - 24x^2 + 9 - (16x^2 - 24x + 9) = 16x^4 - 24x^2 + 9 - 16x^2 + 24x - 9$
 $= 16x^4 - 40x^2 + 24x$
 $-2x \cdot (4x^2 - 4x + 1) - 8x - 12x^2 = -8x^3 + 8x^2 - 2x - 8x - 12x^2 = -8x^3 - 4x^2 - 10x$
 $-x \cdot (9x^2 - 6x + 1) + 2 \cdot (x^4 - 6x^2 + 9) = -9x^3 + 6x^2 - x + 2x^4 - 12x^2 + 18 = 2x^4 - 9x^3 - 6x^2 - x + 18$
 $16x^4 - 8x^2 + 1 - (9x^2 - 1) = 16x^4 - 8x^2 + 1 - 9x^2 + 1 = 16x^4 - 17x^2 + 2$
 - $x^6 - 4x^2 - 5x^4 + 10x^2 = x^6 - 5x^4 + 6x^2$
 $x^2 - 49 - (9x^2 - 42x + 49) = x^2 - 49 - 9x^2 + 42x - 49 = -8x^2 + 42x - 98$
 $9 - 4x^2 - 3 + 2x = -4x^2 + 2x + 6$
 $4x^2 - 6x + 9 - 4x^2 = -6x + 9$
 $-(4x^2 - 4x + 1) - (1 - 4x^2) = -4x^2 + 4x - 1 - 1 + 4x^2 = 4x - 2$
 - $3x \cdot (x^2 - 9) = 3x^3 - 27x$
 $(2x - 5) \cdot (1 - 2x)^2 = (2x - 5) \cdot (1 - 4x + 4x^2) = 2x - 8x^2 + 8x^3 - 5 + 20x - 20x^2$
 $= 8x^3 - 28x^2 + 22x - 5$
 $(x^2 - 4x + 4) \cdot (2x + 1) = 2x^3 + x^2 - 8x^2 - 4x + 8x + 4 = 2x^3 - 7x^2 + 4x + 4$
 $-2x \cdot (9x^2 - 4) \cdot (9x^2 - 4) = -2x \cdot (9x^2 - 4)^2 = -2x \cdot (81x^4 - 72x^2 + 16) = -162x^5 + 144x^3 - 32x$
 $(4x^2 - 1) \cdot (4x^2 + 1) = 16x^4 - 1$

- 16**
- $27x^3 + 54x^2 + 36x + 8$
 $-x^3 + 15x^2 - 75x + 125$
 $-64 - 144x - 108x^2 - 27x^3 = -27x^3 - 108x^2 - 144x - 64$
 - $125x^3 + 300x^2y + 240xy^2 + 64y^3$
 $27x^3 - 54x^2y + 36xy^2 - 8y^3$
 $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$
 - $27a^6 + 54a^4b + 36a^2b^2 + 8b^3$
 $x^6 + 6x^4y^3 + 12x^2y^6 + 8y^9$
 $-8x^6 + 36x^4y^2 - 54x^2y^4 + 27y^6$
 - $x^3 + x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{27}$
 $-27x^3 - \frac{27}{2}x^2 - \frac{9}{4}x - \frac{1}{8}$
 $\frac{1}{125}x^3 - \frac{9}{50}x^2y + \frac{27}{20}xy^2 - \frac{27}{8}y^3$

- 17**
- $(x^3 + 3x^2 - 7x + 2) : (x + 3)$
- | | |
|-----------------------|-----------|
| $x^3 + 3x^2 - 7x + 2$ | $x + 3$ |
| $-x^3 - 3x^2$ | $x^2 - 7$ |
| $-7x + 2$ | |
| $+7x + 21$ | |
| $+23$ | |
- $x^3 + 3x^2 - 7x + 2 = (x + 3) \cdot (x^2 - 7) + 23$

$$(x^3 + x^2 + x + 1) : (x^2 - 1)$$

$$\begin{array}{r} x^3 \quad + x^2 \quad + x \quad + 1 \\ - x^3 \quad \quad \quad + x \\ \hline x^2 \quad + 2x \quad + 1 \\ - x^2 \quad \quad \quad + 1 \\ \hline 2x \quad + 2 \end{array} \left| \begin{array}{l} x^2 - 1 \\ x + 1 \end{array} \right.$$

$$x^3 + x^2 + x + 1 = (x^2 - 1) \cdot (x + 1) + 2x + 2$$

$$(2x^3 - 9x^2 + 13x - 6) : (2x - 3)$$

$$\begin{array}{r} 2x^3 \quad - 9x^2 \quad + 13x \quad - 6 \\ - 2x^3 \quad + 3x^2 \\ \hline - 6x^2 \quad + 13x \quad - 6 \\ + 6x^2 \quad - 9x \\ \hline 4x \quad - 6 \\ - 4x \quad + 6 \\ \hline 0 \end{array} \left| \begin{array}{l} 2x - 3 \\ x^2 - 3x + 2 \end{array} \right.$$

$$2x^3 - 9x^2 + 13x - 6 = (2x - 3) \cdot (x^2 - 3x + 2)$$

$$(6x^3 + 17x^2 - x - 4) : (3x + 1)$$

$$\begin{array}{r} 6x^3 \quad + 17x^2 \quad - x \quad - 4 \\ - 6x^3 \quad - 2x^2 \\ \hline + 15x^2 \quad - x \quad - 4 \\ - 15x^2 \quad - 5x \\ \hline - 6x \quad - 4 \\ + 6x \quad + 2 \\ \hline - 2 \end{array} \left| \begin{array}{l} 3x + 1 \\ 2x^2 + 5x - 2 \end{array} \right.$$

$$6x^3 + 17x^2 - x - 4 = (3x + 1) \cdot (2x^2 + 5x - 2) - 2$$

b) $(3x^4 - 5x^2 + 2) : (3x^2 - 2)$

$$\begin{array}{r} 3x^4 \quad - 5x^2 \quad + 2 \\ - 3x^4 \quad + 2x^2 \\ \hline - 3x^2 \quad + 2 \\ + 3x^2 \quad - 2 \\ \hline 0 \end{array} \left| \begin{array}{l} 3x^2 - 2 \\ x^2 - 1 \end{array} \right.$$

$$3x^4 - 5x^2 + 2 = (3x^2 - 2) \cdot (x^2 - 1)$$

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

$$(4x^5 - 5x^4 + 1) : (x - 1)$$

$\begin{array}{r} 4x^5 - 5x^4 \\ - 4x^5 + 4x^4 \\ \hline - x^4 \end{array}$	+ 1	$\begin{array}{c} x - 1 \\ \hline 4x^4 - x^3 - x^2 - x - 1 \end{array}$
$\begin{array}{r} + x^4 - x^3 \\ - x^3 \end{array}$	+ 1	
$\begin{array}{r} + x^3 - x^2 \\ - x^2 \end{array}$	+ 1	
$\begin{array}{r} + x^2 - x \\ - x \end{array}$	+ 1	
$\begin{array}{r} + x \\ 0 \end{array}$		
$\begin{array}{r} - x \\ + x \end{array}$	- 1	
$\begin{array}{r} \\ \hline 0 \end{array}$		

$$4x^5 - 5x^4 + 1 = (x - 1) \cdot (4x^4 - x^3 - x^2 - x - 1)$$

$$(x^5 + 1) : (x^2 - x + 1)$$

$\begin{array}{r} x^5 \\ - x^5 + x^4 - x^3 \\ \hline x^4 - x^3 \end{array}$	+ 1	$\begin{array}{c} x^2 - x + 1 \\ \hline x^3 + x^2 - 1 \end{array}$
$\begin{array}{r} - x^4 + x^3 - x^2 \\ \hline + x^3 - x^2 \end{array}$	+ 1	
$\begin{array}{r} - x^2 \\ + x^2 - x + 1 \end{array}$	+ 1	
$\begin{array}{r} - x \\ + 2 \end{array}$		
$\begin{array}{r} \\ \hline - x + 2 \end{array}$		
$\begin{array}{r} \\ \hline \end{array}$		
$\begin{array}{r} \\ \hline \end{array}$		

$$x^5 + 1 = (x^2 - x + 1) \cdot (x^3 + x^2 - 1) - x + 2$$

$$(x^4 + 3x^3 - x + 1) : (x^2 - 4x + 1)$$

$\begin{array}{r} x^4 + 3x^3 - x + 1 \\ - x^4 + 4x^3 - x^2 \\ \hline + 7x^3 - x^2 - x + 1 \end{array}$	+ 1	$\begin{array}{c} x^2 - 4x + 1 \\ \hline x^2 + 7x + 27 \end{array}$
$\begin{array}{r} - 7x^3 + 28x^2 - 7x \\ \hline + 27x^2 - 8x + 1 \end{array}$	+ 1	
$\begin{array}{r} - 27x^2 + 108x - 27 \\ \hline 100x - 26 \end{array}$	+ 1	
$\begin{array}{r} \\ \hline 100x - 26 \end{array}$		
$\begin{array}{r} \\ \hline \end{array}$		
$\begin{array}{r} \\ \hline \end{array}$		
$\begin{array}{r} \\ \hline \end{array}$		

$$x^4 + 3x^3 - x + 1 = (x^2 - 4x + 1) \cdot (x^2 + 7x + 27) + 100x - 26$$

18 a) $(2x^2 - 5x - 3) : (x - 3)$

$a = 3$	$\left \begin{array}{cc c} 2 & -5 & -3 \\ + & + & \\ \hline 6 & 3 & \end{array} \right.$	$Q(x) = 2x + 1 \quad \text{et} \quad r = 0$
	$\left \begin{array}{cc c} 2 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \right.$	

b) $(x^4 + x^3 - 2x^2 + x + 3) : (x + 1)$

$a = -1$	$\left \begin{array}{ccccc c} 1 & 1 & -2 & 1 & 3 \\ + & + & + & + & + \\ \hline -1 & 0 & 2 & -3 & \end{array} \right.$	$Q(x) = x^3 - 2x + 3 \quad \text{et} \quad r = 0$
	$\left \begin{array}{ccccc c} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ \hline 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \end{array} \right.$	

$$(3x^3 - 7x^2 + 5x - 10) : (x - 2)$$

	3	-7	5	-10	
	+	+	+	+	
a = 2	6	-2	6		
	3	-1	3	-4	
Q(x) = 3x ² - x + 3 et r = -4					

$$(x^3 - 2x^2 + x - 6) : (x + 2)$$

	1	-2	1	-6	
	+	+	+	+	
a = -2	-2	8	-18		
	1	-4	9	-24	
Q(x) = x ² - 4x + 9 et r = -24					

$$\text{c) } (5x^2 - 1) : (x + 1)$$

	5	0	-1		
	+	+	+		
a = -1	-5	5			
	5	-5	4		
Q(x) = 5x - 5 et r = 4					

$$(x^3 + 27) : (x + 3)$$

	1	0	0	27	
	+	+	+	+	
a = -3	-3	9	-27		
	1	-3	9	0	
Q(x) = x ² - 3x + 9 et r = 0					

$$(2x^3 - 2x - 4) : (x - 2)$$

	2	0	-2	-4	
	+	+	+	+	
a = 2	4	8	12		
	2	4	6	8	
Q(x) = 2x ² + 4x + 6 et r = 8					

$$(x^4 + x^3 - 2x^2 + 3x - 3) : (x - 1)$$

	1	1	-2	3	-3
	+	+	+	+	+
a = 1	1	2	0	3	0
	1	2	0	3	0
Q(x) = x ³ + 2x ² + 3 et r = 0					

$$(2x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 7x + 4) : (x - 2)$$

	2	-5	6	-7	4
	+	+	+	+	+
a = 2	4	-2	8	2	2
	2	-1	4	1	6
Q(x) = 2x ³ - x ² + 4x + 1 et r = 6					

$$\text{c) } (5x^2 - 1) : (x + 1)$$

$$\text{d) } (5x^4 - 3x^2 + 2) : (x - 3)$$

	5	0	-3	0	2
	+	+	+	+	+
a = 3	15	45	126	378	
	5	15	42	126	380
Q(x) = 5x ³ + 15x ² + 42x + 126 et r = 380					

$$(x^4 + 3x^3 + 3x - 2) : (x + 1)$$

$$(x^5 - x^3 + 2x + 3) : (x - 1)$$

	1	3	0	3	-2
	+	+	+	+	+
a = -1	-1	-2	2	-5	
	1	2	-2	5	-7
Q(x) = x ³ + 2x ² - 2x + 5 et r = -7					

$$(x^5 - x^3 + 2x + 3) : (x - 1)$$

	1	0	-1	0	2	3
	+	+	+	+	+	+
a = 1	1	1	0	0	0	2
	1	1	0	0	2	5
Q(x) = x ⁴ + x ³ + 2 et r = 5						

19) $A(x) = D(x) \cdot Q(x)$

$$A(x) = (2x + 3) \cdot (2x - 1) = 4x^2 - 2x + 6x - 3 = 4x^2 + 4x - 3$$

20) $A(x) = D(x) \cdot Q(x)$

En utilisant la méthode des coefficients indéterminés, on a

$$x^3 - x^2 - 9x + a = (x - 3) \cdot (mx^2 + nx + p)$$

$$x^3 - x^2 - 9x + a = mx^3 + nx^2 + px - 3mx^2 - 3nx - 3p$$

$$x^3 - x^2 - 9x + a = mx^3 + (n - 3m)x^2 + (p - 3n)x - 3p$$

$$1 = m$$

$$-1 = n - 3m$$

$$-9 = p - 3n$$

$$a = -3p$$

$$-1 = n - 3 \cdot 1$$

$$-9 = p - 3 \cdot 2$$

$$a = -3 \cdot (-3)$$

$$-1 = n - 3$$

$$-9 = p - 6$$

$$a = 9$$

$$2 = n$$

$$-3 = p$$

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

En utilisant le tableau d'Horner, on a

	1	-1	-9	a
		+	+	+
a = 3		3	6	-9
	1	2	-3	0
	$a + (-9) = 0$			

$$\begin{aligned} a &= 9 \\ a &= \mathbf{9} \end{aligned}$$

Autre méthode :

$$\begin{aligned} A(3) &= 0 \\ 3^3 - 3^2 - 9 \cdot 3 + a &= 0 \\ 27 - 9 - 27 + a &= 0 \\ -9 + a &= 0 \\ a &= \mathbf{9} \end{aligned}$$

21 $A(x) = D(x) \cdot Q(x) + r$

$$\begin{aligned} 4x^3 + x + a &= (2x + 1) \cdot (mx^2 + nx + p) + 3 \\ 4x^3 + x + a &= 2mx^3 + 2nx^2 + 2px + mx^2 + nx + p + 3 \\ 4x^3 + x + a &= 2mx^3 + (2n + m)x^2 + (2p + n)x + (p + 3) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{llll} 4 = 2m & 0 = 2n + m & 1 = 2p + n & a = p + 3 \\ 2 = m & 0 = 2n + 2 & 1 = 2p - 1 & a = 1 + 3 \\ & -2 = 2n & 2 = 2p & \\ & -1 = n & 1 = p & \mathbf{a = 4} \end{array}$$

Transférer

1 $2 \cdot ((2x + 9) + (2x - 5)) = 64$
 $2 \cdot (2x + 9 + 2x - 5) = 64$
 $2 \cdot (4x + 4) = 64$
 $8x + 8 = 64$
 $8x = 56$
 $x = 7$

La valeur de x doit être de 7 cm.

Vérification :

$$\begin{aligned} \text{Longueur du rectangle : } 2x + 9 &= 2 \cdot 7 + 9 = 14 + 9 = 23 \text{ cm} \\ \text{Largeur du rectangle : } 2x - 5 &= 2 \cdot 7 - 5 = 14 - 5 = 9 \text{ cm} \\ \text{Périmètre du rectangle : } (23 + 9) \cdot 2 &= 32 \cdot 2 = \mathbf{64 \text{ cm}} \end{aligned}$$

2 $\frac{((x + 4) + (x - 2)) \cdot (x - 1)}{2} = 48$
 $\frac{(x + 4 + x - 2) \cdot (x - 1)}{2} = 48$
 $\frac{(2x + 2) \cdot (x - 1)}{2} = 48$
 $\frac{2x^2 - 2x + 2x - 2}{2} = 48$
 $\frac{2x^2 - 2}{2} = 48$
 $\frac{2 \cdot (x^2 - 1)}{2} = 48$
 $x^2 - 1 = 48$
 $x^2 = 49$
 $x = 7$

(La valeur négative est à rejeter.)

La valeur de x doit être de 7 cm.

Vérification :

$$\begin{aligned} \text{Longueur de la grande base du trapèze : } 7 + 4 &= 11 \text{ cm} \\ \text{Longueur de la petite base du trapèze : } 7 - 2 &= 5 \text{ cm} \\ \text{Hauteur du trapèze : } 7 - 1 &= 6 \text{ cm} \\ \text{Aire du trapèze : } ((11 + 5) \cdot 6) : 2 &= (16 \cdot 6) : 2 = 96 : 2 = \mathbf{48 \text{ cm}^2} \end{aligned}$$

3

$$\begin{aligned}x^2 - (x - 6)^2 &= 96 \\x^2 - (x^2 - 12x + 36) &= 96 \\x^2 - x^2 + 12x - 36 &= 96 \\12x - 36 &= 96 \\12x &= 132 \\x &= 11\end{aligned}$$

La valeur de x doit être de 11 cm.

Vérification :

Côté du grand carré : 11 cm
 Aire du grand carré : $11 \cdot 11 = 121 \text{ cm}^2$
 Côté du petit carré : $11 - 2 \cdot 3 = 11 - 6 = 5 \text{ cm}$
 Aire du petit carré : $5 \cdot 5 = 25 \text{ cm}^2$
 Aire de la partie colorée : $121 - 25 = 96 \text{ cm}^2$

4

$$\begin{aligned}(30 - 2x) \cdot (20 - 2x) &= 4x^2 \\600 - 60x - 40x + 4x^2 &= 4x^2 \\-60x - 40x + 4x^2 - 4x^2 &= -600 \\-100x &= -600 \\x &= 6\end{aligned}$$

La valeur de x doit être de 6 cm.

Vérification :


Côté d'un petit carré : 6 cm
 Aire d'un petit carré : $6 \cdot 6 = 36 \text{ cm}^2$
 Aire des 4 petits carrés : $4 \cdot 36 = 144 \text{ cm}^2$
 Longueur du rectangle coloré : $30 - 2 \cdot 6 = 30 - 12 = 18 \text{ cm}$
 Largeur du rectangle coloré : $20 - 2 \cdot 6 = 20 - 12 = 8 \text{ cm}$
 Aire du rectangle coloré : $18 \cdot 8 = 144 \text{ cm}^2$

5 Soit x le nombre cherché

$$\begin{aligned}(x + 1)^2 &= x^2 + 19 \\x^2 + 2x + 1 &= x^2 + 19 \\x^2 + 2x - x^2 &= 19 - 1 \\2x &= 18 \\x &= 9\end{aligned}$$

Ce nombre est 9.

Vérification :


Nombre : 9
 Nombre augmenté de 1 : $9 + 1 = 10$
 Carré du nombre : $9^2 = 81$
 Carré du nombre augmenté de 1 : $10^2 = 100$ 

6 Soit x le nombre cherché

$$\begin{aligned}(x - 10)^2 &= x^2 - 320 \\x^2 - 20x + 100 &= x^2 - 320 \\x^2 - 20x - x^2 &= -320 - 100 \\-20x &= -420 \\x &= 21\end{aligned}$$

Ce nombre est 21.

Vérification :

Nombre : 21
 Nombre diminué de 10 : $21 - 10 = 11$
 Carré du nombre : $21^2 = 441$
 Carré du nombre diminué de 10 : $11^2 = 121$ 

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES

7 Calculons $125^2 - 123^2$.

$$\begin{aligned} 125^2 - 123^2 &= (124 + 1)^2 - (124 - 1)^2 \\ &= 124^2 + 2 \cdot 124 + 1 - 124^2 + 2 \cdot 124 - 1 \\ &= 4 \cdot 124 \\ &= 496 \end{aligned}$$

On peut donc en déduire que $125^2 - 123^2 = 496 = 4 \cdot 124$.

Calculons $163^2 - 161^2$.

$$\begin{aligned} 163^2 - 161^2 &= (162 + 1)^2 - (162 - 1)^2 \\ &= 162^2 + 2 \cdot 162 + 1 - 162^2 + 2 \cdot 162 - 1 \\ &= 4 \cdot 162 \\ &= 648 \end{aligned}$$

On peut donc en déduire que $163^2 - 161^2 = 648 = 4 \cdot 162$.

Calculons $201^2 - 199^2$.

$$\begin{aligned} 201^2 - 199^2 &= (200 + 1)^2 - (200 - 1)^2 \\ &= 200^2 + 2 \cdot 200 + 1 - 200^2 + 2 \cdot 200 - 1 \\ &= 4 \cdot 200 \\ &= 800 \end{aligned}$$

On peut donc en déduire que $201^2 - 199^2 = 800 = 4 \cdot 200$.

Généralisons.

Si x est un nombre entier, on a

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 = 4x$$

Effectuons $(x + 1)^2 - (x - 1)^2$

$$\begin{aligned} (x + 1)^2 - (x - 1)^2 &= (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) \\ &= x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 \\ &= 4x \end{aligned}$$

On peut donc en déduire que $(x + 1)^2 - (x - 1)^2 = 4x$

Deux autres égalités du même type :

$$16^2 - 14^2 = 4 \cdot 15 = 60$$

$$251^2 - 249^2 = 4 \cdot 250 = 1000$$

8

$$\begin{aligned} (2x^2 + 2x + 1)^2 &= (2x + 1)^2 + (2x^2 + 2x)^2 \\ (2x^2 + 2x + 1) \cdot (2x^2 + 2x + 1) &= 4x^2 + 4x + 1 + 4x^4 + 8x^3 + 4x^2 \\ 4x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 4x^3 + 4x^2 + 2x + 2x^2 + 2x + 1 &= 4x^4 + 8x^3 + 8x^2 + 4x + 1 \\ 4x^4 + 8x^3 + 8x^2 + 4x + 1 &= 4x^4 + 8x^3 + 8x^2 + 4x + 1 \\ \Rightarrow (2x^2 + 2x + 1)^2 &= (2x + 1)^2 + (2x^2 + 2x)^2 \end{aligned}$$

\Rightarrow Le triangle est rectangle. (Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.)

Si $x = 1$, les dimensions du triangle rectangle sont **3, 4 et 5**.

$$2x + 1 = 2 \cdot 1 + 1 = 2 + 1 = \mathbf{3}$$

$$2x^2 + 2x = 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 2 + 2 = \mathbf{4}$$

$$2x^2 + 2x + 1 = 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 + 1 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 = 2 + 2 + 1 = \mathbf{5}$$

Si $x = 2$, les dimensions du triangle rectangle sont **5, 12 et 13**.

$$2x + 1 = 2 \cdot 2 + 1 = 4 + 1 = \mathbf{5}$$

$$2x^2 + 2x = 2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 8 + 4 = \mathbf{12}$$

$$2x^2 + 2x + 1 = 2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 + 1 = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + 1 = 8 + 4 + 1 = \mathbf{13}$$

Si $x = 3$, les dimensions du triangle rectangle sont **7, 24 et 25**.

$$2x + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 6 + 1 = \mathbf{7}$$

$$2x^2 + 2x = 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 = 2 \cdot 9 + 2 \cdot 3 = 18 + 6 = \mathbf{24}$$

$$2x^2 + 2x + 1 = 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 1 = 2 \cdot 9 + 2 \cdot 3 + 1 = 18 + 6 + 1 = \mathbf{25}$$

Si $x = 10$, les dimensions du triangle rectangle sont **21, 220 et 221**.

$$2x + 1 = 2 \cdot 10 + 1 = \mathbf{21}$$

$$2x^2 + 2x = 2 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 = 2 \cdot 100 + 2 \cdot 10 = 200 + 20 = \mathbf{220}$$

$$2x^2 + 2x + 1 = 2 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 1 = 2 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 1 = 200 + 20 + 1 = \mathbf{221}$$

- 9** Soient x et $x + 1$ deux entiers consécutifs

$$(x + 1)^2 - x^2 = x^2 + 2x + 1 - x^2 = 2x + 1$$

$2x + 1$ est un nombre impair.

- 10** Soient $x - 1$, x et $x + 1$ trois naturels consécutifs

$$\begin{aligned} (x - 1) \cdot x \cdot (x + 1) + x &= x \cdot (x - 1) \cdot (x + 1) + x \\ &= x \cdot (x^2 - 1) + x \\ &= x^3 - x + x \\ &= x^3 \end{aligned}$$

x^3 est le cube de x .

ou

$$\begin{aligned} x \cdot (x + 1) \cdot (x + 2) + x + 1 &= (x^2 + x) \cdot (x + 2) + x + 1 \\ &= (x^3 + 2x^2 + x^2 + 2x) + x + 1 \\ &= x^3 + 3x^2 + 2x + x + 1 \\ &= x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \\ &= (x + 1)^3 \end{aligned}$$

$(x + 1)^3$ est le cube de $x + 1$

- 11** Soit x et y les deux nombres cherchés

$$\begin{aligned} 2 \cdot (x^2 + y^2) &= (x - y)^2 + (x + y)^2 \\ 2x^2 + 2y^2 &= x^2 - 2xy + y^2 + x^2 + 2xy + y^2 \\ 2x^2 + 2y^2 &= 2x^2 + 2y^2 \\ \Rightarrow 2 \cdot (x^2 + y^2) &= (x - y)^2 + (x + y)^2 \end{aligned}$$

- 12** $4 \cdot x \cdot y = (x + y)^2 - (x - y)^2$

$$\begin{aligned} 4xy &= x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 2xy + y^2) \\ 4xy &= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\ 4xy &= 4xy \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 4 \cdot x \cdot y = (x + y)^2 - (x - y)^2$$